

Acciones a tomar ante la sospecha de la enfermedad

- Póngase en contacto su Médico Veterinario, él sabrá que hacer.
- Seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria.
- No visitar otras granjas.
- Contar con fosa séptica y enterrar los animales muertos.
- No permitir la entrada de animales hasta 60 días después de la enfermedad.



Para más información, acude a la Delegación de la SAGARPA, CADER, DDR, o Comité de Fomento y Protección Pecuaria más cercano



CUALQUIER CASO SOSPECHOSO DE DEP, REPÓRTALO AL LOS SIGUIENTES TELÉFONOS.

Tels. 01 (55) 59051000 EXT. 53204 o 53200
01 (55) 52593035, 52591441, 36180021 AL 30
SIN COSTO 01 (800) 75.12.100

REGIÓN	CPA		DEAR	
	Estados	Teléfono	Estados	Teléfono
1	Baja California B. C. Sur Chihuahua Nayarit Sinaloa Sonora	(01) 66.22.59.98.20 y 24 Ext. 74263 Cel. 66.21.87.20.55	Baja California B. C. Sur Chihuahua Sinaloa Sonora	(01) 66.22.59.98.24 ext. 74260 y 74263 Cel. 66.22.06.95.96
2	Coahuila Durango Nuevo Leon Región lagunera	(01) 81.81.91.91.38 81.11.60.75.03 Cel. 44.91.86.45	Coahuila Durango Región Lagunera Nuevo Leon Tamaulipas	(01) 81.81.91.91.38 Ext. 77262 y 77263 CONMUTADOR (01) 81.11.60.75.03 Cel. 81.15.53.54.81
3	S. L. Potosí Tamaulipas Veracruz norte	(01) 44.48.22.70.21 44.48.22.5232 Cel. 44.41.42.88.32	Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco Michoacán Nayarit Zacatecas	(01) 33.38.38.64.36 (01) 33.36.35.36.06 Ext. 66150. 8120438016 Cel. 33.34.96.78.34
4	Aguascalientes colima Guanajuato Jalisco Michoacán Zacatecas	(01) 33.36.35.36.06 33.38.38.64.36 Cel. 33.10.25.80.51	S. L. Potosí Veracruz	(01) 22.88.41.63.65 al 67 Ext. 41287 Cel. 55.22.41.19.80
5	Guerrero Puebla Tlaxcala Veracruz centro	(01) 22.22.36.78.54 01.800.82.38.180 Cel. 22.24.84.17.71	Distrito Federal Edo. México Morelos Querétaro	59051000 Ext. 53206 y 53204 Cel. 55.10.15.72.05
6	Chiapas Oaxaca Tabasco Veracruz sur	(01) 96.16.02.02.56 96.16.02.02.79 Cel. 96.11.28.92.17	GuerreroHidalgo Puebla Tlaxcala	(01) 22.21.99.78.15 (01) 22.22.36.78.54 Cel. 22.26.12.82.25
7	Campeche Quintana roo Yucatán	(01) 99.99.43.15.35 99.99.43.34.35 Cel. 99.92.33.17.06	Chiapas Oaxaca Tabasco	(01) 96.16.17.10.50 Ext.30296 Cel. 96.11.43.21.30
8	Distrito Federal Edo. MéxicoHidalgo Morelos Querétaro	(01) 55.52.59.14.41 55.52.59.30.35 Cel. 55.37.34.25.25	CampecheQuintana Roo Yucatán	(01) 99.99. 43.08.32 Ext. 36033 Cel. 99.91.77.32.20

O A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS

sivedear.dgsa@senasica.gob.mx
gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN



DIARREA EPIDÉMICA PORCINA (DEP)



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE ANIMALES
SANOS Y CALIDAD AGROPECUARIA



La Diarrea Epidémica Porcina

Es una enfermedad viral exclusiva de los cerdos, muy contagiosa y en la mayoría de las veces ocasiona la muerte. Esta enfermedad afecta el sistema digestivo y los lechones mueren en un periodo de 3-5 días a causa de la diarrea y deshidratación.

Reconozca las señales de la enfermedad

- Vómito (se confunde con Gastroenteritis Transmisible).
- Diarrea en lechones y hembras reproductoras.
- Deshidratación.
- Pérdida del apetito.
- Aumento de muertes en lechones.
- Decaimiento.
- Los animales más grandes son más resistentes a la enfermedad.



Diseminación de la enfermedad

- Por medio de cerdos infectados de nuevo ingreso a la granja.
- Por personas que hayan estado en contacto con cerdos enfermos.



Propagación

El virus se propaga a través de las heces de los cerdos enfermos, los animales sanos se infectan al entrar en contacto con ellas. La enfermedad afecta a casi toda la piara, viéndose más afectados los lechones. El virus causante de la enfermedad puede ser transportado en calzado, ropa, herramientas, vehículos, así como por personas que hayan estado en contacto con cerdos enfermos.

Prevención

La Diarrea Epidémica Porcina es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que es necesario adoptar y reforzar todas las medidas necesarias que nos permitan prevenir el contagio de la misma, entre ellas las siguientes:

- Control de entradas de animales.
- Registro de visitantes.
- Baño obligatorio antes de ingresar a las instalaciones, utilizar botas y overoles limpios.
- Desinfección de todos los vehículos y objetos que entren a la granja.
- Higiene y desinfección intensa.
- Manejo de todo dentro-todo fuera en la granja.
- Utilizar tapetes sanitarios.
- Desinfección periódica de corrales de engorda y lactancia.

Vacunación

Actualmente no existe vacunación contra esta enfermedad. **NO SE DEJE SORPRENDER.**

